

HORTALIZAS



Para establecer la huerta casera se debe seleccionar un lote de preferencia cerca de la vivienda, donde se pueda disponer de agua, materia orgánica, las eras o camas para las hortalizas deben construirse de 1,20x0,60 metros.

Factores a tener en cuenta para la producción de hortalizas.

HORTALIZA	SISTEMA DE SIEMBRA	GERMINACIÓN DÍAS	TRANSPLANTE DÍAS	COSECHA DÍAS
Cilantro	Directa	6	0	60
Cebolla cabezona	Directa, transplante	10	40	140
Cebolla larga	Hijuelos, semillas	7	35 - 40	75
Zanahoria	Directa	10	0	100 - 120
Tomate	Directa, transplante	5 - 8	20 - 30	75
Repollo	Transplante	5	30	100 - 120
Lechuga	Transplante	4	20 - 30	60 - 65
Acelga	Directa	6 - 8	25 - 30	50 - 65

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Implementación de estrategias que fomenten ingresos alternativos para los agricultores, producción de alimentos para el sustento dentro de las fincas o trueque entre vecinos.

Usted fue seleccionado para recibir este kit, esperamos lo cuide y lo multiplique para que asegure la alimentación de su familia con la producción de alimentos limpios desde su finca.

RECOMENDACIONES



De la finca al consumidor

Café Nespresso sostenible y con trazabilidad del Huila - Colombia

NESPRESSO

SKN Caribecafé



Solidaridad



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia



Implementada por giz

AVES



POLLOS DE ENGORDE

- ✓ Tener limpio y desinfectado el galpón.
- ✓ No debe exceder de 12 pollos por metro cuadrado.
- ✓ La cama, puede ser en viruta de madera o cascarilla de arroz con un espesor de 3 a 5 cm.
- ✓ Manejar cortinas plásticas para regular la temperatura (cerradas o abiertas).
- ✓ Proporcionar durante los primeros 7 días, 23 horas de luz y solo 1 de oscuridad para incentivar la ingesta de alimento.
- ✓ Suministrar agua limpia y a temperatura ambiente las 24 horas del día.

- ✓ Dar alimento según su necesidad.

PERIODO (DÍAS)	CANTIDAD (GRAMOS)
1 a 7	35
8 a 12	50
13 a 18	100
19 a 23	110
24 a 34	140
35 a 42	160
43 a 50	210
51 a 60	230
Después de 60	220

Los pollos a sus 45 días han consumido 4,5 kilos de concentrado y han ganado un peso promedio de 2,8 kilos.

GALLINAS PONEDORAS

- ✓ Las gallinas ponedoras son aves de corral de fácil manejo.
- ✓ Tener limpio y desinfectado el galpón.
- ✓ Máximo 4 a 5 aves por metro cuadrado.
- ✓ Un nido por cada 4 aves.

- ✓ Suministrar agua limpia y a temperatura ambiente las 24 horas del día.
- ✓ En la noche se debe dejar unas horas sin luz para dar descanso a las aves.
- ✓ Plan de alimentación por ave.



- ✓ Semana 16 a 19 concentrado de postura 75 gr.
- ✓ Semana 20 concentrado de postura 80 gr, iniciar mezcla de maíz para disminuir costos.

MAÍZ AMARILLO ICA V305

- ✓ Épocas de siembra para la zonas cafeteras marzo - abril y septiembre - octubre.
- ✓ Distancia de siembra de 1 x 0,40 metros. Cuando se siembra solo y cuando es intercalado va en la calle del cultivo de café.
- ✓ Sembrar de 2 a 3 semillas en cada sitio.
- ✓ El maíz requiere de buena humedad durante los primeros 90 días.

- ✓ Semana 22 y siguientes semanas Concentrado de postura 110 gr.

- ✓ Se debe fertilizar cuando la planta de maíz tiene 6 hojas definidas con 10 gr de fertilizante, una segunda fertilización a los 25 o 30 días.
- ✓ El Maíz no se debe aporcar.
- ✓ En los 90 días ya podemos cosechar maíz choclo y entre los 160 y 175 días obtenemos grano seco.

FRÍJOL

- ✓ Épocas de siembra para la zonas cafeteras marzo - abril y septiembre - octubre
- ✓ Distancia de siembra del fríjol 1,5 x 0,45 metros. Cuando se siembra solo y cuando es intercalado va en la calle del cultivo de café.

- ✓ Sembrar de 2 semillas en cada sitio.
- ✓ El fríjol requiere de suministro de agua constantemente.
- ✓ Se debe fertilizar en el momento de la siembra.
- ✓ Cosechar entre los 85 y 120 días.

